

- HEMEROCALLIS lancifolia**: foliis lanceolatis septemnerviis.
Hemerocallis japonica. Flor. Japon. p. 142.
- HEMEROCALLIS japonica**: foliis ovatis undulatis multinerviis.
Hemerocallis japonica. Kämpf. Icon. Select. tab. II.
Folia radicalia, petiolata, ovata, acuminata, undulata, multinervia, transversim tenuissime venosa, glabra, palmaria.
Petioli alati, membranacei, palmares vel paulo ultra.
Flores ut in *Hem. japonica*.
- TETRAGONIA expansa**: foliis subcordatis ovatis punctatis, floribus axillaribus solitariis.
Tetragonia japonica. Flor. Japon. p. 208.
- TERNSTROEMIA japonica**: foliis acuminatis excisis.
Cleyera japonica. Flor. Japon. p. 224.
- CORCHORUS flexuosus**: foliis duplicato-ferratis cuspidatis, caule flexuoso.
Caulis teres, a foliis decurrentibus subangulatus, flexuosus, glaber, erectus, bipedalis.
Folia alterna, petiolata, oblique cordata, ovata, cuspidata, duplicato-ferrata, villosa, patula, bipollicaria.
Flores in ramis terminales, lutei.
- CORCHORUS ferratus**: foliis oblongis ferratis cuspidatis, ramis glabris.
Caulis erectus, glaber, ramosus.
Rami teretes, purpurei, glabri, erecti.
Folia alterna, petiolata, oblonga, ferrata ferraturis magnis apice fetaceis, cuspidata, supra tenuissime villoso-scabra, subtus glabra, bipollicaria, patula.
- CORCHORUS scandens**: foliis ovatis fetaceo-ferratis oppositis, caule ramisque flexuoso-scandentibus.

Caulis